



Boletim informativo

Doença Hemorrágica Viral (DHV) em coelhos

Sobre a doença

- A Doença Hemorrágica Viral (DHV) é uma doença infecto-contagiosa dos coelhos (mansos e bravos) causada por um vírus (*Calcivírus*), quase sempre fatal, que provoca a morte do animal num espaço de cerca de 48 horas após a infeção;
- O vírus transmite-se por contato direto entre coelhos doentes ou pelo contato com material orgânico proveniente de coelhos doentes. A sua transmissão também é possível através de vetores vivos e de objetos contaminados, podendo o homem funcionar como um meio de disseminação da doença principalmente durante o período venatório;
- Não é considerada uma doença transmissível ao homem, nem a animais de outras espécies;

Como principal forma de evitar a propagação da DHV, é muito importante que se recolham e eliminem todos os coelhos encontrados mortos no campo.

A colaboração de todos é essencial!

Normas para a recolha e eliminação dos coelhos encontrados mortos

↪ Recolher todos os coelhos encontrados mortos e proceder de uma das seguintes formas:

Enterra-los no local onde foram encontrados (cobrindo-os com cal, antes de tapar a cova);

OU

Colocá-los num saco de plástico bem vedado e depositá-los no Serviço de Desenvolvimento Agrário da Graciosa, em local identificado para o efeito.

Para esclarecimentos adicionais contactar o número 917 719 278.

↪ Para **evitar o contacto direto com os coelhos** (vivos ou mortos), devem **utilizar-se luvas descartáveis ou um saco de plástico**, que devem ser posteriormente eliminadas juntamente com os coelhos.

↪ Deverá proceder-se à desinfeção do material utilizado (sachos, pás, etc.), vestuário e calçado, com um desinfetante que tenha ação viricida ou em alternativa utilizar lixívia.