



Boletim informativo

Procedimento perante aparecimento de coelhos-bravos mortos

A ocorrência de coelhos-bravos mortos, nos últimos dias, na ilha de São Jorge, poderá indiciar a ocorrência da doença hemorrágica viral (DHV), embora a sua confirmação esteja ainda dependente dos resultados laboratoriais dos coelhos-bravos enviados para análise.

Considerando a necessidade de se acautelarem eventuais repercussões ao nível da saúde pública, resultantes do surgimento de um elevado número de coelhos-bravos mortos no campo, e de se reduzirem as hipóteses de disseminação da eventual doença, pelas populações de coelhos-bravos e coelhos-mansos, torna-se necessário, no mínimo prudente, atender ao seguinte:

Sobre a doença

- A Doença Hemorrágica Viral (DHV) é uma doença infecto-contagiosa dos coelhos (mansos e bravos) causada por um vírus (*Calcivírus*), quase sempre fatal, que provoca a morte do animal num espaço de cerca de 48 horas após a infeção;
- O vírus transmite-se por contato direto entre coelhos doentes ou pelo contato com material orgânico proveniente de coelhos doentes. A sua transmissão também é possível através de vetores vivos e de objetos contaminados, podendo o homem funcionar como um meio de disseminação da doença, principalmente durante o período venatório;
- Não é considerada uma doença transmissível ao homem, nem a animais de outras espécies.

Como principal forma de evitar a propagação da DHV, é muito importante que se recolham e eliminem todos os coelhos encontrados mortos no campo.

A colaboração de todos é essencial!

Normas para a recolha e eliminação dos coelhos encontrados mortos:

- ↳ Recolher todos os coelhos encontrados mortos e proceder de uma das seguintes formas:

Enterra-los no local onde foram encontrados (cobrindo-os com cal, antes de tapar a cova)

ou

Colocá-los num saco de plástico bem vedado e depositá-los, em local identificado para o efeito, no Viveiro Florestal das Sete Fontes ou no antigo Viveiro da Ribeira Seca.

Para esclarecimentos adicionais contactar o número 295.403741/742/743.

- ↳ Para **evitar o contacto direto com os coelhos**, devem **utilizar-se luvas descartáveis ou um saco de plástico**, que devem ser posteriormente eliminados juntamente com os coelhos.
- ↳ Deverá proceder-se à desinfeção do material utilizado (sachos, pás, etc.), vestuário e calçado, com um desinfetante que tenha ação viricida ou em alternativa utilizar lixívia.

6 de janeiro de 2015